

**Meine Empfehlung:**  
**Nimm alle 1-2 Jahre an einem**  
**Erste-Hilfe-am-Hund-Kurs teil.**



**NOTFALL-CHECKLISTE : Vitalwerte beim Hund**


[ERSTE HILFE BEIM HUND - Vitalwerte \(erste-hilfe-beim-hund.de\)](http://erste-hilfe-beim-hund.de)

**Körpertemperatur:**

[ERSTE HILFE BEIM HUND - Temperatur messen \(erste-hilfe-beim-hund.de\)](http://erste-hilfe-beim-hund.de)

## Temperatur messen beim Hund

- Lebensgefahr ab 41 Grad
- akut lebensbedrohlich ab 42 Grad
- bis 39 Grad normal



Nur die rektale Messung (im Po) ist zuverlässig !

<b>ab 42°</b>	<b>akut lebensbedrohliches Fieber, körpereigenes Eiweiss droht zu gerinnen</b>
<b>ab 41°</b>	<b>Lebensgefahr wenn lang anhaltend, Organversagen droht</b>
<b>ab 41°</b>	<b>hohes Fieber</b>
<b>ab 40°</b>	<b>Fieber</b>
<b>39° bis 40°</b>	erhöhte Temperatur, nach Sport und Aufregung noch ok
<b>38° bis 39°</b>	<b>Normal</b>





Weitere Hinweise beachten: [www.erste-hilfe-beim-hund.de](http://www.erste-hilfe-beim-hund.de)

**Herz / Puls:**

[ERSTE HILFE BEIM HUND - Puls prüfen \(erste-hilfe-beim-hund.de\)](http://erste-hilfe-beim-hund.de)

## Puls messen beim Hund

- der Hund sollte entspannt sein
- ideal ist es, wenn er auf der Seite liegt
- beruhigend auf den Hund einreden



**15 Sekunden messen, dann Ergebnis x 4**

Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie den Puls nicht gleich finden!

Sie brauchen unter Umständen mehrere Versuche, das ist ganz normal.





### Vorgehensweise:

1. die Beinschlagader auf der Innenseite des Oberschenkels ertasten
2. dann mit zwei Fingern den Puls fühlen
3. fünfzehn Sekunden lang den Puls mitzählen, dann das Ergebnis x 4
4. das Messergebnis (die Anzahl Herzschläge in einer Minute) mit den Normalwerten vergleichen



Weitere Hinweise beachten: [www.erste-hilfe-beim-hund.de](http://www.erste-hilfe-beim-hund.de)

## Atmung:

[ERSTE HILFE BEIM HUND - Atmung prüfen \(erste-hilfe-beim-hund.de\)](http://erste-hilfe-beim-hund.de)

## Wasserbedarf:

[ERSTE HILFE BEIM HUND - Wasserbedarf \(erste-hilfe-beim-hund.de\)](http://erste-hilfe-beim-hund.de)

## Hautelastizität, innere Austrocknung, Dehydration:

[ERSTE HILFE BEIM HUND - Dehydration prüfen \(erste-hilfe-beim-hund.de\)](http://erste-hilfe-beim-hund.de)

## Notfall: Schock erkennen

[ERSTE HILFE BEIM HUND - Schock erkennen \(erste-hilfe-beim-hund.de\)](http://erste-hilfe-beim-hund.de)

## Notfall: Kapillare Füllzeit prüfen

[ERSTE HILFE BEIM HUND - Kapillare Füllzeit \(erste-hilfe-beim-hund.de\)](http://erste-hilfe-beim-hund.de)

## Das TAPS-Schema

[ERSTE HILFE BEIM HUND - TAPS-Schema \(erste-hilfe-beim-hund.de\)](http://erste-hilfe-beim-hund.de)

**TIPP:** Nimm die Werte in regelmäßigen Abständen immer wieder neu auf. So hast Du zum einen immer die aktuellen Werte parat und bleibst zum anderen in Übung und verbesserst Deine Sicherheit im Umgang mit dem Abnehmen der Vitalwerte, was gerade im Akutfall sehr nützlich ist, da in der Aufregung tatsächlich nur Übung Sicherheit gibt.



# Vitalwerte beim Hund

- Lebensgefahr ab 41 Grad
- akut lebensbedrohlich ab 42 Grad
- Schockzustand testen



**Körperinnentemperatur : in Ruhe, Alttier bis 39 Grad  
Welpen bis 39,5 Grad (rektal gemessen)**

**Dehydration prüfen / Hautelastizität**

**Atmung :  
10 bis 40 Atemzüge / Minute**

**kapillare Füllzeit an der  
Mundschleimhaut : max 2 s**

**Herz : großer Hund 80 bis 100,  
kleiner Hund 100 bis 120  
Herzschläge / Minute**

**Lymphknoten prüfen,  
12 Lymphknoten äusserlich gut abtastbar**



Weitere Hinweise beachten: [www.erste-hilfe-beim-hund.de](http://www.erste-hilfe-beim-hund.de)